


1) TOPOGRAFIA

Mucosa oral imóvel que circunda os dentes e o osso alveolar;

- cor: rosa pálida com pigmentações escuras;
- junção muco-gengival (ausente no palato duro).

1) TOPOGRAFIA



1) TOPOGRAFIA

Sulco gengival: aspecto clínico

- Epitélio: estrat. pavimentoso não queratinizado , sendo paraqueratinizado próximo à borda livre da gengiva.
- Preenchido pelo fluido crevicular (fluido que atravessa o epitélio juncional)

Sulco geng
(0,5-2mm)



2) EPITÉLIO GENGIVAL (gengiva livre e gengiva inserida)

- Gengiva inserida: epit. estrat. pavimentoso orto ou paraceratinizado, com papilas conjuntivas (córion denso) e cristas epiteliais;
- Gengiva livre: a) sulcular (não ceratinizado, sem papilas conjunt. e córion frouxo) e b) da gengiva oral (paracerat. com papilas conjuntivas e cristas epiteliais e córion denso não modelado);
- Epitélio de inserção: estratificado pavimentoso com espaços intercelulares amplos.

2) EPITÉLIO GENGIVAL


- Col gengival: não ceratinizado e delgado
- Epitélio de inserção: estratificado pavimentoso com duas lâminas basais (interna e externa).

2) EPITÉLIO GENGIVAL

Epitélio de inserção: origem da junção do epitélio reduzido do esmalte com o epitélio oral.

2) EPITÉLIO GENGIVAL

Col gengival: evolução com a idade (mais largo, acompanhando a área de contato interdental, e mais cervical).



3) JUNÇÃO DENTO-GENGIVAL

Renova-se após remoção.

- superfícies: cimento,
esmalte e materiais
restauradores.

4) TECIDO CONJUNTIVO –

FIBRAS

- dento gengivais;
- dentoperiostais;
- transeptais;
- interpapilares;
- alvéolo-gengivais;
- circulares.

5) SUPRIMENTO VASCULAR

- ramos do periósteo;
- ramos do LPD;
- ramos intra-septais.